1 System

症例	使用器具	行動	評価･判定表示	得点
デフテラ	ドレーン	本体の細胞質を吸引	OK	30
	メス	硬質化した本体を切り取る	Defeat	600
	ピンセット	硬質化した本体を回収トレイに運ぶ	OK	40
デフテラ生成腫瘍	レーザー	腫瘍を焼却する	OK	10
電子装置	ピンセット	チップを回収トレイに運ぶ	OK	20
	ピンセット	最後のチップを回収トレイに運ぶ	Cool/Good/Bad	220/120/60
	ピンセット	プラグを抜く	OK	0
	ピンセット	プラグを回収トレイに運ぶ	OK	20
	ピンセット	最後のプラグを回収トレイに運ぶ	Cool/Good/Bad	200/120/60
動脈瘤	注射	収縮剤を瘤に投与する	OK	30
	メス	瘤を切り離す	OK	50
	ピンセット	瘤を回収トレイに運ぶ	OK	50
	ドレーン	患部の血溜まりを吸引	OK	0
	ピンセット	血管を繋げる	OK	40
	針と糸	血管の接合部を縫う	Cool/Good/Bad	170/120/60
特殊チップ	レーザー	特殊チップの機能を停止させる（再起動時も含む）	OK	20
	メス	特殊チップを切り離す	OK	50
	ピンセット	特殊チップを回収トレイに運ぶ	Cool/Good/Bad	100/50/20
特殊腫瘍	ドレーン	組織液を吸引する	OK	40
	メス	血管を切り取る	OK	30
	ピンセット	患部を回収トレイに運ぶ	OK	130
内出血	メス	患部を切開	OK	80
	ドレーン	患部の血溜まりを吸引	OK	10
	針と糸	切開部を縫合	Cool/Good/Bad	120/70/30
熱病腫瘍	ドレーン	患部の組織液を吸引	OK	10
	メス	熱病腫瘍を切り取る	OK	10
	ピンセット	熱病腫瘍をトレイに運ぶ	Cool/Good/Bad	80/50/30
	ピンセット	人工膜を切除痕に乗せる	OK	20
	ヒールゼリー	人工膜を定着させる	OK	30
破裂炎症	注射	破裂炎症に同色の薬を投与する	OK	10
	注射	最後の破裂炎症に同色の薬を投与する	Cool/Good/Bad	80/50/20
	ヒールゼリー	傷口（患部破裂時に発生）を治療	OK	10
	ヒールゼリー	最後に残った傷口（患部破裂時に発生）を治療	Cool/Good/Bad	80/50/20
	針と糸	裂傷（患部破裂時に発生）を縫う	Cool/Good/Bad	120/70/30
ブラキオン	注射	爪に新薬を投与する	OK	0
	メス	爪を切り離す	OK	0
	ピンセット	爪を回収トレイに運ぶ（最後の爪以外）	OK	0
	ピンセット	最後の爪を回収トレイに運び、本体を弱らせる	OK	120
	ピンセット	最後の爪を回収トレイに運び、本体を消滅させる	Defeat	600
閉創	針と糸	術野を閉じる	Cool/Good/Bad	240/150/90
	ヒールゼリー	縫合痕を消毒する	OK	0
	保護テープ	テーピング	Cool/Good/Bad	260/180/100
ペースメーカー回収	ヒールゼリー	接合部を消毒する	OK	10
	メス	接合部を切る	OK	20
	ドレーン	切開部の血溜まりを吸引	OK	0
	ピンセット	リードを抜く	OK	30
	針と糸	切開口を縫う	OK	50
	ピンセット	リードを回収トレイに運ぶ	OK	30
	ピンセット	ペースメーカーを回収トレイに運ぶ	Cool/Good/Bad	240/150/80
ペースメーカー設置	ピンセット	ペースメーカーを設置する	OK	100
	ピンセット	リードを本体に取り付ける	OK	30
	エコー	接続部を特定する	OK	0
	メス	接続部を切る	OK	20
	ドレーン	接続部の血溜まりを吸引	OK	0
	ピンセット	リードを接続部に挿す	OK	30
	針と糸	接合部を縫う（1個目）	OK	50
	針と糸	接合部を縫う（2個目）	Cool/Good/Bad	250/160/100
火傷	ドレーン	血溜まりを吸引	OK	0
	ピンセット	移植皮膚を患部に乗せる	OK	0
	ヒールゼリー	移植皮膚を定着させる	Cool/Good/Bad	80/50/20
ライフル弾摘出	ドレーン	血溜まりを吸引	OK	0
	メス	弾痕を切り開く	OK	50
	ドレーン	弾痕の血溜まりを吸引	OK	0
	ピンセット	ライフル弾を引き抜く	OK	0
	ピンセット	ライフル弾を回収トレイに運ぶ	Cool/Good/Bad	180/120/60
裂傷	針と糸	裂傷を縫う	Cool/Good/Bad	120/70/30



Chapter 02

Basic Technique

［基本術式］